

LA NUTRITION PARENTERALE

Comment ça se passe ?

Fiche Technique de branchement sur chambre implantable

La méthode peut changer selon les centres de nutrition

Quoi qu'il en soit, le soin doit se faire en STERILE et la montée de la perfusion par PALIERS

Matériel

Nécessaire pour le lavage des mains ; Un flacon d'antiseptique ; Un rouleau de sparadrap ; Un masque ; 10 compresses stériles ; Une paire de gants stérile ; Une ligne de perfusion ; Une blouse ; Un pansement ; Une aiguille avec prolongateur ; 1 boitier ; Un champ et bien sur la pompe à perfusion et la poche nutritive (la sortir 45 minutes avant)

Technique

- Nettoyer le plan de travail
- Se mettre torse nu, mettre le masque et la blouse
- Préparer la poche nutritive (vérifier la date de péremption, l'intégrité de la poche, le nom figurant sur la poche nutritive et le volume)
- Suspendre la poche
- Se laver les mains
- Verser le matériel sur le champ
- Mettre le gant (droit si le patient est droitier et gauche si le patient est gaucher)
- Verser l'antiseptique sur les compresses
- Mettre l'autre gant
- Clamper et démêler la ligne
- Enlever les protections de la ligne et les protéger à l'aide d'une compresse
- Tenir l'embout de la poche avec une compresse
- Adapter le prolongateur avec l'aiguille

- Mettre le boîtier
- Adapter la ligne de perfusion (enfoncer complètement l'embout sur la poche)
- Remplir le filtre au 3/4
- Déclamper la ligne et la purger (tenir la cassette verticalement à l'envers), jusqu'à l'extrémité de la ligne
- Clamper la ligne
- Nettoyer le plan cutané
- Ôter la protection de l'aiguille
- Maintenir la chambre entre le pouce et l'index (main gauche pour les droitiers)
- Enfoncer l'aiguille jusqu'au fond de la chambre (déclat métallique)
- Glisser (si besoin) la compresse sèche pliée en 4 sous l'aiguille
- Mettre le pansement propre
- Déclamper la ligne de perfusion
- Mettre une compresse sur la connexion ligne poche
- Ôter les gants
- Mettre du sparadrap sur la connexion et sur le boîtier
- Adapter la ligne sur la machine et régler le débit (débit max : 250 à 300ml/h)
- Mettre en route la pompe
- Évacuer le matériel usagé, nettoyer le plan de travail et se laver les mains
- Préparer le matériel pour le débranchement

NB : L'aiguille doit être changée à chaque nouvelle perfusion